

Ghid recoltare analize

Suntem conștienți cât de important este pentru dumneavoastră ca rezultatele analizelor pe care le efectuați în laboratorul nostru să fie corecte, urmând ca aceste valori să fie interpretate de medicul curant care stabilește diagnosticul și conduita terapeutică. Dar, în această acțiune, avem nevoie de cooperarea dumneavoastră. Acesta este motivul pentru care am întocmit un ghid de recoltare, cu informații legate despre cum trebuie prelevată fiecare probă.

Pregătire recoltare sânge

Recoltarea se face dimineața, înainte de consumul unor alimente sau băuturi. Se respectă o pauză alimentară de 12 ore, nu se administrează niciun fel de tratament și nu se face efort fizic susținut în dimineața respectivă. Nerespectarea acestor reguli pot determina modificări ale valorilor analizelor dumneavoastră.

Pregătire recoltare exudat nazal

Prealabil recoltării, vă rugăm să nu utilizați decongestionante nazale (picături sau spray) și să nu efectuați toaleta locală.

Recoltarea exudatului nazal se efectuează înainte de a urma administrarea tratamentului cu antibiotice sau după încetarea acestuia, la un interval de minim 7 zile. Analiza nu se efectuează dacă sunteți în timpul tratamentului antibiotic.

Pregătire recoltare exudat faringian

Înainte de recoltare nu trebuie să ingerați alimente, lichide și să nu efectuați periajul dentar sau să folosiți apa de gură. Este interzis fumatul cu 2 ore înainte de recoltarea probei.

Este important ca recoltarea să o faceți înaintea începerii unui tratament antibiotic, sau la minim 7 zile de la încetarea acestuia. Deasemeni, proba nu se recoltează dacă sunteți sub terapie cu antibiotic.

Pregătire recoltare spută

Începeți pregătirea prin periajul dinților și clătirea gurii cu apă. Recoltarea se face prin tuse spontană și profundă. Relevante pentru examenul microbiologic sunt probele de secreție muco-purulentă. Proba o recoltați într-un recipient steril procurat din farmacie și apoi o transportați în laborator în maximum o oră. Dacă proba are aspect de salivă, vă rugăm să repetați recoltarea.

Recomandarea este de a recolta sputa înaintea începerii unui tratament antibiotic sau la minim 7 zile de la încetarea acestuia, deasemeni nu se efectuează în timpul terapiei antibiotice.

Sumar de urină și urocultură

Pregătirea pentru recoltare o începeți prin a vă spala organele genitale și mainile cu săpun, fără a folosi substanțe dezinfectante. Recoltarea o faceți într-un recipient special steril, pe care îl procurați din farmacie. Dacă sunteți în timpul fluxului menstrual, va trebui să utilizați tampoane intravaginale. Veți recolta din prima urină de dimineață, din jetul mijlociu, aproximativ 20ml. După recoltarea probei, în maxim o ora o veți transporta în laborator.


În cazul sugarilor: zona genito-urinară trebuie spălată cu apă și săpun; în cazul băieților se decalotează și se spală cu apă și săpun și glandul, apoi se șterge cu o compresă sterilă de la uretră către exterior. Dumneavoastră trebuie să vă asigurați că zona pubiană și perineală sunt uscate și să nu aplicați creme, uleiuri sau pudre pediatrice. Se utilizează punga pediatrică de recoltare a urinei pe care o atașați ferm pe zona genito-urinară, dezlipind banda protectoare în jumătatea inferioară a pungii și fixând banda adezivă la nivelul perineului. Apoi dezlipiți cealaltă jumătate a pungii și o fixați în jurul orificiului urinar. Punga o verificați periodic, la 10 minute și după recoltare o legați și o introduceți în urocultor.

Analiza se va efectua înaintea începerii unui tratament antibiotic sau la minim 7 zile de la încetarea acestuia, deasemeni nu se efectuează în timpul terapiei antibiotice.

Coprocultura, coproparazitologic

Proba o veți recolta cu ajutorul spatulei care însoțește coprocultorul, prelevând în special mucozități, zone cu urme de sânge, din 3 zone diferite ale bolului fecal. Pentru analiza de coprocultură se utilizează un coprorecoltor cu mediu, iar pentru analiza coproparazitologică un coprorecoltor fără mediu. Proba recoltată în recipient fără mediu de transport, trebuie prelucrată în laborator în maxim 2 ore de la recoltare.

Analiza se recomandă înaintea începerii tratamentului antibiotic sau antiparazitar.



**Pentru informații suplimentare, vă rugăm să sunați la Recepție Laborator analize medicale
Policlinica Centrală Dr. Vlăescu: 0351 444 844**